

Spirifer verneuilli

Classificazione	
Dominio	Eukaryota Woese e al. 1990
Regno:	Animalia Linnaeus, 1758
Phylum:	Brachiopoda
Subphylum:	Rhynchonelliformea
Classe:	Rhynchonellata
Ordine:	†Spiriferida
Superfamiglia	†Spiriferoidea
Famiglia:	†Spiriferidae
Genere:	† <i>Spirifer</i>
Specie:	† <i>verneuilli</i>
Età/ Distribuzione:	Ordoviciano superiore (Katiano, circa 449 milioni di anni fa) e il Triassico medio (Ladinico, circa 232 milioni di anni fa).
Descrizione	Brachiopodi estinti. Caratterizzati da una conchiglia allungata trasversalmente, che a volte presentava una piega mediana e un seno. Il margine cardinale era dritto, e solitamente rappresentava il massimo diametro della conchiglia, caratterizzata da terminazioni cardinali alate, acuminate o arrotondate. La superficie esterna presentava granulazioni, strie e coste di diverse forme a seconda delle specie, che nella zona corrispondente al solco mediano e della piega potevano anche non essere presenti. Le striature erano attraversate da linee concentriche di accrescimento, che potevano presentarsi anche sotto forma di lamelle o addirittura spine.
Provenienza:	I resti fossili si rinvencono in tutto il mondo in depositi di ambienti di acque calme, temperate o calde.
Fornitore	Ditta F. PISANI - Comptoir Minéralogique et Géologique (Parigi)
Numero inventario	08
N° campioni	02

